

**1. 인플루엔자**

- 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 외래환자 1,000명당 **8.2명**으로 전주(7.0명) 대비 증가
※ 2019-2020절기 인플루엔자 유행기준: 5.9명(/외래환자 1,000명당)
- (병원체) 바이러스는 46주 **11건**[A(H1N1)pdm09 9건, A(H3N2) 2건], 이번절기 **총 75건**[A(H1N1)pdm09 55건, A(H3N2)형 17건, B형 3건] 검출됨

2. 급성호흡기감염증

- 바이러스성 급성호흡기감염증 환자는 **1,704명**(리노바이러스 613명(36.0%), 호흡기세포융합바이러스 408명(23.9%), 아데노바이러스 316명(18.5%), 파라인플루엔자바이러스 145명(8.5%), 사람코로나바이러스 119명(7.0%))으로 전주대비 감소
- 세균성 급성호흡기감염증 환자는 **543명**(마이코플라즈마균 534명, 클라미디아균 9명)으로 전주대비 증가
- 중증급성호흡기감염증(SARI) 신규 환자는 **227명**(인플루엔자 13명(5.7%), 폐렴 134명(59.0%))으로 전주대비 감소
- (병원체) 급성호흡기감염증 바이러스는 총 **141건** 검출(검출율 52.6%, 리노바이러스 19.8%, 아데노바이러스 9.7%)

3. 장관감염증

- 바이러스성 장관감염증 환자는 **79명**(노로바이러스 33명, 로타바이러스 19명 등), 세균성 장관감염증 환자는 **134명**(클로스트리듐 퍼프린젠스 50명, 캄필로박터균 48명 등) 발생
- (병원체) 45주차 바이러스는 총 **1건** 검출(검출률 5.0%, 아스트로바이러스 5.0%), 세균은 총 **13건** 검출(검출률 17.1%, 살모넬라균 6.6%, 대장균 3.9%)

4. 수족구병 및 엔테로바이러스

- (수족구병) 의사환자 분율은 1,000명당 **3.1명**(0~6세 3.9명, 7~18세 0.8명)으로 전주(3.7명) 대비 감소
- (엔테로바이러스감염증) 환자는 **25명**(무균성수막염 11명, 수족구병 8명 등)으로 전주(39명) 대비 감소
- (병원체) 44주 엔테로바이러스 **3건** 검출(검출률 23.1%)

5. 안과감염병

- (유행성각결막염) 의사환자 분율은 1,000명당 **13.9명**(0~6세 45.8명, 7~19세 28.4명, 20세 이상 11.8명)으로 전주(13.9) 대비 동일함
- (급성출혈성결막염) 의사환자 분율은 1,000명당 **0.3명**(20세 이상 0.3명, 0~6세 0.0명, 7~19세 0.0명)으로 전주(0.5명) 대비 감소함



목차

1. 인플루엔자	1
1.1. 인플루엔자 의사환자 임상감시	
1.2. 인플루엔자 병원체감시	
2. 급성호흡기감염증	4
2.1. 바이러스	
2.1.1. 임상감시	
2.1.2. 병원체감시	
2.2. 세균	
2.2.1. 임상감시	
2.3. 중증급성호흡기감염병 감시	
3. 장관감염증	13
3.1. 바이러스	
3.1.1. 임상감시	
3.1.2. 병원체감시(45주)	
3.2. 세균	
3.2.1. 임상감시	
3.2.2. 병원체감시(45주)	
4. 수족구병 및 엔테로바이러스	20
4.1. 수족구병 의사환자 임상감시	
4.2. 엔테로바이러스 임상감시	
4.3. 엔테로바이러스 병원체감시(45주)	
5. 안과감염병	23
5.1. 유행성각결막염 및 급성출혈성결막염 의사환자 임상감시	
[참고] 1. 국외 인플루엔자 발생 정보	24
2. 국외 안과감염병 발생 정보	27

1. 인플루엔자

1.1. 인플루엔자 의사환자 임상감시


◎ 주간 인플루엔자 의사환자 분율

○ 46주차 인플루엔자의사환자 분율¹⁾은 외래환자 1,000명당 **8.2명**으로, 전주 7.0명 대비 **증가**


※ 2019-2020절기 인플루엔자 유행기준: 5.9명(/외래환자 1,000명당)

(단위: 명)

구분	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
의사환자분율*(/1,000)	3.6	3.7	3.8	3.9	4.2	4.6	4.5	5.8	7.0	8.2



◎ 연령별 인플루엔자 의사환자 분율



< 연령별 인플루엔자의사환자 분율 >

주 1) 인플루엔자의사환자 분율(전분율) = 인플루엔자의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000

구분	전체	0세	1-6세	7-12세	13-18세	19-49세	50-64세	65세 이상
42주	4.6	1.2	6.2	6.7	6.1	6.7	3.2	0.7
43주	4.5	2.5	6.7	7.2	4.5	4.9	2.6	1.2
44주	5.8	3.0	8.4	11.6	5.8	5.1	3.0	1.7
45주	7.0	5.1	10.4	13.2	8.0	5.9	3.0	2.1
46주	8.2	4.3	11.5	19.7	8.0	7.0	3.8	1.8

- 본 정보는 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 의사환자 : 38℃이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
- 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 200개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원)

1.2. 인플루엔자 병원체감시2)

○ 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황


- 2019-2020절기 46주까지 인플루엔자 바이러스 총 75건 검출 [A(H1N1)pdm09 55건, A(H3N2) 17건, B형 3건]
- 46주차에 268건의 호흡기 검체 중 양성 11건[A(H1N1)pdm09 9건, A(H3N2) 2건]

< 2019-2020 절기 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황>

[단위: 건수(%)]

구분	A(H1N1)pdm09	A(H3N2)	A(Not subtyped)	B	총계
43주	7 (77.8)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
44주	11 (78.6)	3 (21.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (100.0)
45주	11 (61.1)	6 (33.3)	0 (0.0)	1 (5.6)	18 (100.0)
46주	9 (81.8)	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (100.0)
최근4주 누계*	38 (73.1)	13 (25.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	52 (100.0)
이번절기 누계*	55 (73.3)	17 (22.7)	0 (0.0)	3 (4.0)	75 (100.0)

* 2018년 36주 ~ 2019년 46 (2018.9.2. ~ 2019.11.16)




< 2019-2020 절기 주별 인플루엔자 바이러스 검출 현황>


- 본 정보는 인플루엔자 및 호흡기바이러스 병원체 감시사업을 통하여 수집된 호흡기 감염증 환자 검체에 대한 유전자 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로, 변동 가능함)
- 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 52개 감시사업 참여의료기관



연령별/월별 인플루엔자 바이러스 검출현황



절기별/주별 인플루엔자 바이러스 검출현황





2. 급성호흡기감염증

2.1. 바이러스

2.1.1. 임상감시³⁾


◎ 바이러스성 급성호흡기감염증 환자 감시 현황

- 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 **1,704명**으로 전주(1,884명) 대비 **감소**
- 인플루엔자 입원환자는 **102명**으로 전주(91명) 대비 **증가**

(단위: 명)

구분	급성호흡기감염증 바이러스별 환자 신고 현황								인플루엔자 (IFV)
	HAdV	HBoV	HPIV	HRSV	HRV	HMPV	HCoV	계	
43주	436	109	229	234	854	45	74	1,981	83
44주	400	67	203	292	737	38	88	1,825	82
45주	376	66	159	368	798	36	81	1,884	91
46주	316	63	145	408	613	40	119	1,704	102
2019년 누계*	12,596	5,946	11,901	6,258	25,469	6,591	2,688	71,449	10,271
2018년 46주*	473	94	132	904	651	14	314	2,582	211

— HAdV : 아데노바이러스, HBoV : 보카바이러스, HPIV : 파라인플루엔자바이러스, HRSV : 호흡기세포융합바이러스, HRV : 리노(라이노)바이러스, HMPV : 메타뉴모바이러스, HCoV : 코로나바이러스



* 바이러스 전체 수치는 인플루엔자를 제외한 나머지 바이러스 수치의 합계임.

<바이러스성 급성호흡기감염증 신고현황>


3) • 본 정보는 급성호흡기감염증으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)

• 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 196개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)


* 2017년 31주차부터 표본기관을 103개에서 196개로 확대




연령별/주별 바이러스성 급성호흡기감염증 환자 발생 추이




0세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이




1-6세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이




7-12세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이




13-18세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이



19-49세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이



50-64세 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이



65세 이상 주별 바이러스성 급성호흡기감염증 발생 추이

— HADV — HPIV — HRSV — IFV — HCoV — HRV — HBoV — HMPV

2.1.2. 병원체감시⁴⁾

◎ 최근 4주간 급성호흡기감염증 원인바이러스 실험실감시 현황

- 46주차에 268건의 호흡기 검체 중 **141건의** 호흡기 바이러스가 검출됨(**검출율 52.6%**)
 - 리노바이러스(HRV) 및 호흡기세포융합바이러스(HAdV)가 46주차에 각각 **19.8%, 9.7%** 검출됨.


구분	검체건수	바이러스별 검출률(%)								
		전체	HAdV	HPIV	HRSV	IFV	HCoV	HRV	HBov	HMPV
43주	237	46.0	10.1	2.5	5.5	3.8	1.3	21.9	0.4	0.4
44주	260	53.1	9.6	1.5	5.0	5.4	3.8	26.5	1.2	0.0
45주	261	56.3	10.7	2.3	9.6	6.9	2.7	23.0	0.8	0.4
46주	268	52.6	8.2	4.5	9.7	4.1	3.4	19.8	1.9	1.1
2019년 누계	10,287	59.2	7.8	7.3	2.5	12.7	2.2	17.9	3.2	5.6
2018년 [†]	11,966	63.0	6.8	6.1	4.4	17.0	5.7	16.3	1.7	4.9

- HAdV: 아데노바이러스, HPIV: 파라인플루엔자바이러스, HRSV: 호흡기세포융합바이러스, IFV: 인플루엔자바이러스, HCoV: 코로나바이러스, HRV: 리노(라이노)바이러스, HBV: 보카바이러스, HMPV: 메타뉴모바이러스


** 2019년 계: 2019년 1주 ~ 46주 ('18. 12. 30. ~ '19. 11. 16.)

* 2018: 2018년 1주 ~ 2018년 52주 자료 ('17. 12. 31. ~ '18. 12. 29.)

◎ 최근 10주간 급성호흡기감염증 원인바이러스 검출 비율 현황 (2019. 9. 1~ 2019. 11. 16.)



◎ 최근 4주간 지역별 급성호흡기감염증 원인바이러스 검출 비율 및 양성률 (2019. 10. 20.~ 2019. 11. 16.)





4) 본 정보는 인플루엔자 및 호흡기바이러스 병원체 감시사업으로 수집된 호흡기감염증 환자 검체의 유전자검사 결과로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로, 변동 가능함)

● 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 52개 감시사업 참여의료기관(의원급)



◎ 연평균 및 4주 평균 급성호흡기 감염증 원인바이러스 검출률 비교




* 2016년 ~ 2018년 (2016년 1주 ~ 2018년 52주) 평균 검출률


† 2018년 4주 (2018년 43주 ~ 2018년 46주) 평균 검출률

‡ 2019년 최근 4주 (2019년 43주 ~ 2019년 46주) 평균 검출률


◎ 연령별/주별 급성호흡기감염증 원인바이러스 검출 추이




0-6세 주별 급성호흡기감염증 검출 추이




7-12세 주별 급성호흡기감염증 검출 추이




13-18세 주별 급성호흡기감염증 검출 추이



19-49세 주별 급성호흡기감염증 검출 추이



50-64세 주별 급성호흡기감염증 검출 추이




65세 이상 주별 급성호흡기감염증 검출 추이

— HAdV — HPIV — HRSV — IFV — HCoV — HRV — HBoV — HMPV




◎ 최근 3년간 주별 급성호흡기감염증 원인바이러스 검출 추이


검출율(%) 2017년 2018년 2019년




아데노바이러스(HAdV) 최근 3년간 주별 검출 추이




파라인플루엔자바이러스(HPIV) 최근 3년간 주별 검출 추이



RS바이러스(HRSV) 최근 3년간 주별 검출 추이




인플루엔자바이러스(IFV) 최근 3년간 주별 검출 추이




코로나바이러스(HCoV) 최근 3년간 주별 검출 추이



라이노바이러스(HRV) 최근 3년간 주별 검출 추이



보카바이러스(HBoV) 최근 3년간 주별 검출 추이



메타뉴모바이러스(HMPV) 최근 3년간 주별 검출 추이

2.2. 세균

2.2.1. 임상감시⁵⁾

◎ 세균성 급성호흡기감염증 환자 감시 현황

○ 46주차 세균성 급성호흡기감염증 입원환자는 543명으로 전주(482명) 대비 증가

(단위: 명)


구분	세균별 환자 신고 현황 (단위: 명)		
	Mycoplasma	Chlamidia	계
43주	664	7	671
44주	597	9	606
45주	476	6	482
46주	534	9	543
2019년 누적	10,160	279	10,439
2018년 46주	230	4	234



<세균성 급성호흡기감염증 신고현황>

◎ 연령별 호흡기세균 주별 임상감시 현황

* 연령별 임상 감시는 2017년 31주차부터 시작함.



0세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이

1-6세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이

— Mycoplasma

— Chlamydia

5) 세균성 급성호흡기감염증 임상감시 현황은 참여기관에 입원한 환자* 자료로 변동 가능한 잠정통계임


(환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)

• 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 196개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

* 2017년 31주차부터 표본기관을 103개에서 196개로 확대됨




7-12세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이




13-18세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이



19-49세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이



50-64세 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이





65세 이상 주별 세균성 급성호흡기감염증 발생 추이

2.3. 중증급성호흡기감염병 감시

◎ 중증급성호흡기감염병 환자 중 인플루엔자환자 및 폐렴 환자 현황

○ 46주차 신규 SARI환자는 227명이며, 이 중 인플루엔자 환자는 13명(5.7%) 폐렴 환자는 134명(59.0%)임




주별 중증급성호흡기감염병 환자 중 인플루엔자 및 폐렴환자 발생 추이



◎ 중증급성호흡기감염병 환자 연령별 현황

- 46주차 중증급성호흡기감염병 환자는 1-6세가 102명(44.9%), 7-12세가 34명(15.0%), 0세가 32명(14.1%)으로 높게 나타남



<신규 중증급성 호흡기감염병 환자 연령별 현황>

◎ 중증급성호흡기감염병 주차별 원인병원체 현황 (2019. 9. 8. ~ 2019. 11. 16.)

- 46주차 중증급성호흡기감염병의 주요 병원체는 마이코플라즈마균(34.2%)이고, 리노바이러스(22.6%), 호흡기세포융합바이러스(14.1%) 순으로 나타남



<중증급성 호흡기감염병 바이러스별 검출 현황>

- 본 정보는 중증급성호흡기감염병(SARI)으로 표본감시 참여기관에서 수집한 감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * SARI 환자 정의 : 38℃이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자
- 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 13개 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)



◎ 연령별 중증급성호흡기감염병 주별 검출현황




0세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



1-6세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



7-12세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



13-18세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



19-49세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



50-64세 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이



65세 이상 주별 중증급성호흡기감염병 발생 추이





3. 장관감염증

3.1. 바이러스


3.1.1. 임상감시⁶⁾

◎ 바이러스성 장관감염증 환자 감시 현황

○ 46주차 바이러스성 장관감염증 환자는 **79명**으로 전주대비 증가

(단위: 명)

구분	바이러스별 장관감염증 환자 신고 현황					계
	그룹A형 로타바이러스	노로바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로 바이러스	사포바이러스	
43주	22	25	11	10	3	71
44주	30	21	8	8	6	73
45주	20	27	9	11	5	72
46주	19	33	6	9	12	79
2019년 누적	2,624	4,653	488	728	444	8,937
2018년 46주	44	91	38	15	8	196



< 바이러스성 장관감염증 신고현황(2015-2019)>

⁶⁾ 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자* 감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

(환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)

● 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 197개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)

* 2017년 31주차부터 표본기관을 103개에서 192개로 확대

3.1.2. 병원체감시⁷⁾

◎ 최근 4주간 급성설사질환 원인바이러스 검출 현황 (2019. 10. 13. ~ 2019. 11. 9.)


○ 45주차에는 20건의 검체에서 급성설사질환 바이러스 1건(5.0%) 검출

구분	주별			바이러스별 검출건수 (검출률, %)									
	검체건수	양성건수	/검출률 (%)	Group A Rotavirus		Norovirus		Enteric Adenovirus		Astrovirus		Sapovirus	
42주	38	4	(10.5)	1	(2.6)	1	(2.6)	1	(2.6)	1	(2.6)	0	(0.0)
43주	26	1	(3.8)	0	(0.0)	1	(3.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
44주	26	3	(11.5)	0	(0.0)	1	(3.8)	0	(0.0)	1	(3.8)	1	(3.8)
45주	20	1	(5.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(5.0)	0	(0.0)
최근 4주누계	136	11	(8.1)	2	(1.5)	4	(3.0)	1	(0.7)	2	(1.5)	2	(1.5)
2019년 누계	2,459	709	(28.8)	121	(4.9)	458	(18.6)	38	(1.5)	50	(2.0)	42	(1.7)
2018년 누계	3,508	907	(25.9)	248	(7.1)	409	(11.7)	134	(3.8)	93	(2.7)	23	(0.7)

- 대상병원체 ; Norovirus(노로바이러스), Group A Rotavirus(로타바이러스), Enteric Adenovirus(장아데노바이러스), Astrovirus(아스트로바이러스), Sapovirus (사포바이러스)

- 대상 환자 연령 : 5세 이하

◎ 최근 4주 평균 급성설사질환 원인바이러스 검출률 비교



* RoV: 그룹 A 로타바이러스, NoV: 노로바이러스, AdV: 장내아데노바이러스, AsV: 아스트로바이러스, SaV: 사포바이러스

* 장내아데노바이러스는 F형(40, 41)을 포함하여 위장관질환을 유발하는 유전형 전체를 대상으로 함.

* 14-18년 4주 평균('14년 42주 ~ '18년 45주), 2018년 4주 평균('18년 42주 ~ 45주), 2019년 4주 평균('19년 42주 ~ 45주)


7) • 본 급성설사질환 원인바이러스 주별 발생정보는 급성설사 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 실험실 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능 함)
• 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 70개 감시사업 참여의료기관




◎ 최근 5년 급성설사질환 원인바이러스 검출 현황 (2014. 1. 1. ~ 2019. 11. 9.)

※ 바이러스 실험실 감시통계자료는 5세 이하의 환자검체에 한하여 분석된 결과3.2. 세균

검출률 (%) — 14년 1주~18년 52주 (%) — 18년 1주~18년 52주 (%) — 19년 1주~19년 45주 (%)



2019년 45주차




■ NoV ■ RoV ■ AdV ■ SaV
0% 0% 0% 0%

- 14년 1주~18년 52주 : 최근 5년 검출률 (%)
- 18년 1주~18년 52주 : 전년도 검출률 (%)
- 19년 1주~19년 45주 : 올해 검출률 (%)

· RoV : 그룹 A 로타바이러스, · NoV : 노로바이러스,
· AdV : 장내아데노바이러스, · AsV : 아스트로바이러스
· SaV : 사포바이러스

검출률 (%) — 14년 1주~18년 52주 (%) — 18년 1주~18년 52주 (%) — 19년 1주~19년 45주 (%)



· 원인바이러스별 검출방법

- EIA법 (그룹 A 로타바이러스, 장내아데노바이러스), RT-PCR (노로바이러스, 아스트로바이러스, 사포바이러스)

· 노로바이러스 유전형

- GII group : 노로바이러스 유전형 GII.2, GII.3, GII.4를 제외한 나머지 GII group에 속하는 유전형
- GII.2/GII.3 : 노로바이러스 유전형 GII.2와 GII.3

· 그룹 A 로타바이러스 유전형

- Other types : 주요 3가지 유전형(G2.P[4]/ G9.P[8]/ G8.P[8])을 제외한 그룹 A 로타바이러스에 속하는 유전형

- 본 급성설사질환 원인바이러스 주별 발생정보는 급성설사 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 실험실 검사결과를 토대로 분석됨 (본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능 함)
- 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 바이러스분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 70개 감시사업 참여의료기관


3.2.1. 임상감시⁸⁾

◎ 세균성 장관감염증 환자 감시 현황

○ 46주차 세균성 장관감염증 환자는 134명으로 전주(192명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	살모넬라균	장염 비브리오균	대장균	캠필로박 터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	황색 포도알균	바실루스 세레우스균	에르시니아 엔테로콜리타	리스테리아 모노사이토 제네스
43주	68	5	6	56	63	0	0	4	1
44주	65	9	0	57	60	4	0	5	2
45주	64	5	1	60	59	0	0	3	0
46주	30	4	0	48	50	0	0	2	0
2019년 누계	2,493	101	236	3,089	3,143	150	53	117	11
2018년 46주	45	2	4	34	33	0	0	2	0



8) • 본 정보는 표본감시 참여기관의 장관감염증 환자* 감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
 (환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람)
 • 수행기관: 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과 / 전국 197개 장관감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)
 * 2017년 31주차부터 표본기관을 103개에서 192개로 확대

3.2.2. 병원체감시9)



◎ 최근 4주 급성설사질환 원인세균 분리 현황 (2019. 10. 13. ~ 2019. 11. 9.)

○ 45주차는 병원체 분리율이 17.1%로 지난주 19.0% 대비 감소

구분	검체 건수	분리건수 (분리율 %)									
		전체	<i>Salmonella</i> spp.	Pathogenic <i>E.coli</i>	<i>Shigella</i> spp.	<i>V.parahaemolyticus</i>	<i>V. cholerae</i>	<i>Campylobacter</i> spp.	<i>C.perfringens</i>	<i>S.aureus</i>	<i>B.cereus</i>
42주	134	23 (17.2)	5 (3.7)	5 (3.7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1.5)	2 (1.5)	6 (4.5)	3 (2.2)
43주	131	33 (25.2)	8 (6.1)	8 (6.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1.5)	8 (6.1)	3 (2.3)	3 (2.3)
44주	105	20 (19.0)	4 (3.8)	6 (5.7)	0 (0)	1 (1.0)	0 (0)	3 (2.9)	4 (3.8)	1 (1.0)	0 (0)
45주	76	13 (17.1)	5 (6.6)	3 (3.9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2.6)	2 (2.6)	1 (1.3)
최근4주 누계	446	89 (20.0)	22 (4.9)	22 (4.9)	0 (0)	1 (0.2)	0 (0)	7 (1.6)	16 (3.6)	12 (2.7)	7 (1.6)
2019년 누계	7,457	1,170 (15.7)	245 (3.3)	397 (5.3)	1 (0.01)	5 (0.07)	0 (0)	104 (1.4)	153 (2.1)	143 (1.9)	113 (1.5)
2018년	10,020	1,435 (14.3)	317 (3.2)	495 (4.9)	6 (0.1)	14 (0.1)	0 (0)	119 (1.2)	121 (1.2)	170 (1.7)	189 (1.9)

- Pathogens ; *Salmonella* spp., *E. coli* (EHEC, ETEC, EPEC, EIEC), *Shigella* spp., *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio cholerae*, *Campylobacter* spp., *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*


◎ 급성설사질환 원인세균 분리율 비교 : 최근4주간(2019년 42주 ~ 2019년 45주)평균 분리율 대비 현황







9) • 본 정보는 급성설사질환 원인병원체 감시사업을 통하여 수집된 설사환자 검체에 대한 검사결과를 토대로 분석됨
(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)
• 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 세균분석과 / 17개 시도보건환경연구원 / 전국 70개 감시사업 참여의료기관



◎ 최근 4년 급성설사질환 주요 5종 원인세균 분리 현황




과거대비 주별 급성설사질환 원인세균 분리 추이


과거대비 주별 *Salmonella* spp. 분리 추이과거대비 주별 Pathogenic *E. coli* 분리 추이과거대비 주별 *Shigella* spp. 분리 추이과거대비 주별 *Vibrio parahaemolyticus* 분리 추이과거대비 주별 *Campylobacter* spp. 분리 추이




◎ 연령별 급성설사질환 원인세균 주별 분리 현황 (2018. 11. 11. ~ 2019. 11. 9.)




0-6세 급성설사질환 원인세균 주별 분리현황




7-18세 급성설사질환 원인세균 주별 분리현황



19-49세 급성설사질환 원인세균 주별 분리현황



50-64세 급성설사질환 원인세균 주별 분리현황



65세 이상 급성설사질환 원인세균 주별 분리현황

Salmonella
 E. coli
 Shigella
 Vibrio
 Campylobacter



4.1. 수족구병 의사환자 임상감시¹⁰⁾

○ 수족구병 의사환자 임상감시 현황


○ 46주차 수족구병 의사환자 분율*은 외래환자 1,000명당 **3.1명**으로 전주 대비 감소

* 수족구병 의사환자 분율(천분율) = 수족구병 의사환자 수 / 총 진료환자 수 × 1,000


[단위: 천분율(%)]

구분	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
주 전체	27.9	21.8	17.9	16.2	11.8	8.3	8.1	6.9	4.8	3.8	3.3	3.7	3.1
0-6세	34.3	26.5	22.3	19.9	15.0	10.6	10.1	8.6	6.2	4.9	4.1	4.8	3.9
7-18세	5.4	4.0	3.0	2.9	2.0	1.5	1.6	1.3	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8

* 2013년 36주차부터 개편된 수족구병 표본감시체계를 통해 신고된 자료임



<주별 수족구병 의사환자 분율>



<연령별 수족구병 의사환자 분율>

4.2. 엔테로바이러스감염증 임상감시¹⁰⁾

○ 엔테로바이러스감염증 환자 감시 현황

○ 46주차 엔테로바이러스 감염증 신고 환자는 **25명**으로 전주 대비 감소

(단위: 명)


구분	계	무균성 수막염	수족구병	포진성 구협염	심근염	신생아 패혈증	합병증 동반 수족구병	기타
43주	57	33	13	8	0	0	0	3
44주	50	26	8	10	0	0	0	6
45주	39	24	7	6	1	0	0	1
46주	25	11	8	6	0	0	0	0
2019년 누계	4,485	1,754	1,829	606	7	36	9	244
2018년 46주	34	22	3	7	0	0	0	2

¹⁰⁾ 본 정보는 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자 및 엔테로바이러스감염증 환자* 감시자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 수족구 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

* 엔테로바이러스감염증 환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제6항의 진단기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람

• 수행기관: 질병관리본부 감염병총괄과 / 수족구병 표본감시 참여의료기관(95개 의원), 엔테로바이러스감염증 표본감시 참여의료기관(병원급 이상 199개)



<전국 표본기관의 엔테로바이러스감염증 신고현황(2016-2019)>

4.3. 엔테로바이러스 병원체감시¹¹⁾

◎ 최근 4주간 엔테로바이러스 병원체 감시 현황 (2019. 10. 13. ~ 2019. 11. 9.)

○ 45주차 총 13건 검체 중 엔테로바이러스 3건(23.1%) 검출

구분	주별			질환별 엔테로바이러스 검출률(%)			
	검체 건수	검출 건수	검출률 (%)	무균성 수막염	수족구병	합병증 동반 수족구	기타
42주	20	4	20.0	1/8 (12.5)	1/1 (100.0)	0/0 (00.0)	2/11 (18.2)
43주	18	4	22.2	1/7 (14.3)	1/1 (100.0)	0/0 (00.0)	2/10 (20.0)
44주	18	5	27.8	1/1 (100.0)	1/1 (100.0)	0/2 (00.0)	3/14 (21.4)
45주	13	3	23.1	0/2 (00.0)	0/1 (00.0)	0/0 (00.0)	3/10 (30.0)
4주 누계	82	17	20.7	5/25 (20.0)	5/8 (62.5)	0/2 (00.0)	7/49 (14.3)
2019년 누계	1,671	653	39.1	251/668 (37.6)	245/335 (73.1)	14/38 (36.8)	143/630 (22.7)
2018년 누계	2,485	743	29.9	237/881 (26.9)	278/416 (66.8)	27/116(23.3)	201/1072 (18.8)

◎ 질환별 엔테로바이러스 유전자형 검출현황 (2018. 1. 1 ~ 2019. 11. 9.)

무균성수막염	2018년	E11	E30	CB5	CA10	EV71	E25	E3	E6	CA4	RV	E9	CA16	E13	CA19	CB3	CA8	CA9	E5	합계
		42	41	23	13	14	9	8	8	6	4	4	3	3	1	1	1	1	1	183
수족구병	2019년	E30	EV71	CA6	E21	E9	CB5	CA9	CA2	E11	CA4	E15	E7							합계
		102	40	11	8	8	8	6	2	3	1	1	1							191
합병증동반	2018년	CA10	CA4	EV71	CB5	CA8	CA6	CA16	E3	E11	CA21	CA5	CA2	CB4	CB3	E6	RV			합계
		98	28	18	12	9	9	9	6	5	2	1	1	1	1	1	1			202
수족구병	2019년	EV71	CA6	CA4	CA16	E9	CA10	CA5	CA2	E21	RV	E30								합계
		83	51	10	12	8	9	4	2	2	1	1								183
합병증동반	2018년	E30	CB5	CA10	EV71	E13	E11	E25												합계
		10	4	3	2	1	1	1												22
합병증동반	2019년	EV71	E9																	합계
		6	1																	7


- 대상병원체 : CA (콕사키바이러스 A), CB (콕사키바이러스 B), E(에코바이러스), EV (엔테로바이러스), RV(라이노바이러스)

11) 본 정보는 엔테로바이러스 실험실 감시사업을 통하여 수집된 검체에 대한 실험실 검사결과를 토대로 분석된

(본 자료는 보고된 시점의 자료를 바탕으로 분석된 잠정통계로 변동 가능함)

• 수행기관 : 질병관리본부 감염병분석센터 바이러스분석과 / 14개 시도보건환경연구원 / 전국 57개 감시사업 참여의료기관

◎ 질환별 엔테로바이러스 검출현황(병원체감시/임상감시) (2017. 1. 1. ~ 2019. 11. 9.)



- 엔테로바이러스 검출 및 유전자형 분석 방법: Real time RT-PCR, RT-PCR
- 수족구병 의사환자분율 : 질병관리본부 감염병총괄과 임상감시결과
 - 의사환자분율(%) : (수족구병 의사환자 수/표본병원 총 진료환자 수)*1,000
 - 환자 수 : 합병증 동반 수족구병 신고 환자 수

5. 안과감염병

5.1. 유행성각결막염 및 급성출혈성결막염 의사환자 임상감시¹²⁾

○ 주별 유행성각결막염 및 급성출혈성결막염 의사환자 현황


- 46주차 유행성각결막염 의사환자 분율은 1,000명당 **13.9명**으로 전주와 동일, 급성출혈성결막염 의사환자 분율은 1,000명당 **0.3명**으로 전주대비 감소

(단위: 명/1,000)


구분	34주	35주	36주	37주	38주	39주	40주	41주	42주	43주	44주	45주	46주
유행성각결막염	23.0	19.9	20.3	23.1	21.0	18.0	21.2	19.8	17.1	21.4	14.2	13.9	13.9
급성출혈성결막염	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5	0.5	0.3

* 의사환자 분율(%) = 안과감염병 의사환자수/총진료환자수×1,000

※ 안과감염병은 안과개원의 92개 표본감시로 운영, 2013년 36주부터 기관당 환자수에서 환자분율로 변경



<유행성각결막염 주별 의사환자 분율>



<급성출혈성결막염 주별 의사환자 분율>

○ 연령별 유행성각결막염 및 급성출혈성결막염 의사환자 현황

- 유행성각결막염은 연령별로 0-6세(45.8명), 7-19세(28.4명), 20세 이상(11.8명) 순으로 발생함
- 급성출혈성결막염은 연령별로 20세 이상(0.3명), 0-6세(0.0명), 7-19세(0.0명) 순으로 발생함

(단위: 명/1,000)

구분	0-6세	7-19세	20세 이상	전체
유행성각결막염	45.8	28.4	11.8	13.9
급성출혈성결막염	0.0	0.0	0.3	0.3


12) 본 정보는 표본감시 참여기관의 안과감염병 의사환자 감시 자료를 신고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능 함

• 수행기관 : 질병관리본부 감염병관리센터 감염병총괄과/전국 92개 안과감염병 표본감시사업 참여 의료기관(의원)


참고 1 국외 인플루엔자 발생 정보

- (일본) 44주차 의료기관당 환자 수는 0.95명으로 지난주 대비 증가하였으며, 바이러스는 총 377건 [A/H1형 331건, A/H3형 25건, B형 21건] 검출임

★ 자료출처: <http://www.nih.go.jp/niid/ja>




주별 의료기관당 보고환자수(일본)




주별 인플루엔자바이러스 분리현황(일본)

- (홍콩) 45주차 인플루엔자의사환자 분율은 2.9명/(1,000명)으로 지난주 대비 감소, 바이러스 양성 85건 [A/H1형 51건, A/H3형 14건, B형 8건, C형 12건] 검출임

★ 자료출처: http://www.chp.gov.hk/en/guideline1_year/29/134/441/304.html




주별 인플루엔자 의사환자 분율(홍콩)




주별 인플루엔자바이러스 분리현황(홍콩)

- (미국) 45주차 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 **2.3%**로 유행기준(2.2%)보다 높은 수준이며, 바이러스는 총 178건[A형 73건, B형 105건] 검출됨

* 자료출처: <http://www.cdc.gov/flu/weekly/fluactivitysurv.htm>




주별 인플루엔자 의사환자 분율(미국)




주별 인플루엔자바이러스 분리현황(미국)

- (대만) 44주차 외래환자 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 **1.05%**로 전주대비 감소하였고, 45주차 응급실 내원은 **9.08%**로 전주대비 증가하였으며, 바이러스 양성률도 지속적으로 감소하고 있으며 주요 유전자형은 A형이며 45주차 A형 양성률은 **89.0%**임

* 자료출처: <http://www.cdc.gov.tw>



주별 인플루엔자 의사환자 분율(대만)




주별 인플루엔자바이러스 분리현황(대만)

- (영국) 45주차 인플루엔자 의사환자분율(ILI)은 4.6명으로 전주대비 증가하였으며, 바이러스 양성 14건 [A/H1N1pdm09 2건, A(H3N2) 10건, A/not subtyped 1건, B형 1건]


* 자료출처: <http://www.gov.uk/government/publications/weekly-national-flu-reports>

Figure 3: RCGP ILI consultation rates, England



주별 인플루엔자 의사환자 분율(영국)

Figure 10: Number of influenza positive samples and % positive, UK GP sentinel schemes



주별 인플루엔자바이러스 분리현황(영국)

- (중동지역) 서아시아지역 인플루엔자 바이러스 A형과 B형이 혼재되어 발견되었으며, 활동 수준은 매우 낮음

* 자료출처: www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/

※ WHO Global Influenza Update의 서아시아지역* 자료를 토대로 작성됨


* 서아시아지역 17개국(레바논, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 아르메니아, 아제르바이잔, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이스라엘, 조지아, 카타르, 쿠웨이트, 키프로스, 터키)

〈국가별 실험실 감시 현황〉

국가명	기간	바이러스 검출현황
아르메니아	45주차(11.4~11.10)	양성 없음
바레인	45주차(11.4~11.10)	9건 A/H1N1pdm09 5건, A/H3 1건, B형 3건
조지아	45주차(11.4~11.10)	양성 없음
이스라엘	45주차(11.4~11.10)	4건 A/H1N1pdm09 1건, A/not subtyped 1건, B형 2건
요르단	44주차(10.28~11.3)	양성 없음
카타르	('17)37주차(9.11~9.17)	126건 A/H1N1pdm09 37건, A/H3 80건, B형 9건
터키	11주차(3.11~3.17)	16건 A/H1N1pdm09 4건, A/H3 5건, B형 7건

Influenza transmission zone: Western Asia



Number of specimens positive for influenza by subtype



<2019-2020시즌 서아시아지역 주별 인플루엔자 검출 현황>

참고 2 국외 안과감염병 발생 정보

○ (일본) 44주차 유행성각결막염, 급성출혈성결막염 발생현황(<http://www.nih.go.jp/niid/ja>)



<유행성각결막염 주별 의료기관당 보고 환자수>

<급성출혈성결막염 주별 의료기관당 보고 환자수>



감염병 표본감시 주간소식지

(Weekly Sentinel Surveillance Report)

2019년도 46주차(11. 10. ~ 11. 16.)

【 발행기관 】 질병관리본부

【 담당부서 】 감염병총괄과, 세균분석과, 바이러스분석과
(28159) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

【 발 행 인 】 정은경

【 편 집 인 】 염민섭

【 편집위원 】 이동한, 권동혁, 박광숙, 박수진
황규잠, 유재일, 홍사현, 김난옥
한명국, 최우영, 정윤석, 김희만, 이덕용, 조승례,
강혜지, 김정민, 윤영실, 박지현

【 전 화 】 (043)719-7113, 7108

【 팩 스 】 (043)719-7139

【 홈페이지 】 <http://www.cdc.go.kr>(질병관리본부)