

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X
1	가정의학과	디코데서방정 (디히드로코데인타르타르산염)_(60mg/1정)	dihydrocodeine tartrate 60mg	1	정	472	하나 제약(주)	Analgesic(Opioid), Antitussive	암 및 기타 만성 질환 환자에서의 중등도 및 심한 통증의 완화	13세 이상: 1회 60-120mg, 12시간마다 투여	의존성, 호흡억제, 착란, 건망, 두부손상과 두개내압 상승, 혈압저하 및 속	마약 하나인산코데인정(codeine phosphate 20mg/95원, 기관지염, 폐렴, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 호흡기 질환에 동반되는 기침의 진정, 통증의 완화, 1일 최대 240mg, 부-의존성, 호흡억제, 착란, 건망, 무기폐, 기관지경련, 후두부종, 염증성장질환 환자에게 투여 시 마비성 장폐색, 독성거대결장)	단독생산	○
2	내과	썬지로이드정 0.075밀리그램 (레보티록신나트륨수화물)_(75µg/1정)	levothyroxine sodium 75µg	1	정	33	부광약품(주)	Thyroid Product	갑상선기능저하증, 점액수종, 크레틴병, 단순갑상선종	1일 1회, 초회 투여량 25-100µg, 유지량 100-400µg	심근경색, 골감소증, 가슴 뇌종양, 발작, 알레르기반응, 가슴통증, 비정상적인 심장박동, 심한 두통, 신경과민, 근육통	제형추가(0.05mg/26원, 0.1mg/35원, 0.1mg 월 원내사용량-71-21-0-41, 0.15mg/73원-원외처방전용) 원외	(원가보전)	○
3	내과	리조덱플렉스터치주100단위/밀리리터_(1카트리지)	insulin aspart 90I.U(30I.U/mL) insulin degludec 210I.U(70I.U/mL)	3	mL/카트리지	16,876	노보노디스크 제약(주)	Insulin, Combination(rapid-acting, long-acting)	만 2세 이상의 당뇨병 치료	복벽, 상완, 허벅지에 피하 주사, 주사부위는 동일 부위 내에서 위치 변경, 제2형 당뇨병-1일 식사와 함께 10단위, 이후 개별 용량 조절, 제1형 당뇨병-1일 1회 식사와 함께 총 하루 인슐린 요구량의 60-70%, 나머지 식사시 단시간형/속효성 인슐린 투여. 이후 개별 용량 조절	저혈당, 주사부위 반응	제형추가(트레시바플렉스터치주 Insulin degludec 300unit/3mL/16,876원, 노보래피드 플렉스펜주 insulin aspart 300unit/3mL/10,670원)	단독생산	○
4	내과	솔리쿠아펜주 (10-40)_(3mL)	insulin glargine (as human insulin 300I.U(100I.U/mL)) lixisenatide 0.15mg(50µg/mL)	3	mL/펜	39,501	(주) 사노피-아벤티스 코리아	Antidiabetic Agent(Insulin-Long-Acting, Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonist)	성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절(메트포르민과 다른 경구 혈당강화제 병용 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우 이 약과 메트포르민을 병용 투여, 기저 인슐린 단독 투여 이후 혈당조절효과가 불충분한 경우 이 약 투여, 기저인슐린과 메트포르민 병용 투여 이후 혈당조절이 불충분한 경우 이 약과 메트포르민을 병용 투여)	1일 1회, 매일 같은 식사 전 1시간 이내에 피하 주사(복부, 삼각근, 대퇴부 내에서 돌아가며), 하루 최대 용량은 40단위	저혈당증, 어지러움, 오심, 설사, 구토	제형추가(란투스주솔로스타 insulin glargine (as human insulin) 300I.U/3mL/12,245원, <u>릭수미</u> 아펜주10마이크로그램 lixisenatide 0.15mg/3mL/39,442원) 사목X	단독생산	○
5	내과	테넬리아정20밀리그램(테넬리글립틴브롬화수소산염수화물)_(31mg/1정)	teneligliptin hydrobromide hydrate(as teneligliptin 20mg)	1	정	739	(주) 한독	Antidiabetic Agent, Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) Inhibitor	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제(단독요법으로 투여, 메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 본제를 병용요법으로 투여)	1일 1회 20 mg, 식사와 관계없이 복용	저혈당, 변비, 장폐색, 간기능 장애, 간질성 폐렴	가브스정50밀리그램(노바티스, vildagliptin 50mg/448원, 1일 1~2정, 부-떨림, 두통, 현기증, 저혈당, 구역, 쇠약, 체중감소, 다리나 발목이 부음, 월 원내사용량-316-371-377-592) 가드렛정100mg(JW, anagliptin 0.1g/369원, 1일 2회 1정씩, 부-변비, 저혈당증, 변잡혈 양성, 월 원내사용량-14-0-40-68) 자누비아정50밀리그램(MSD, sitagliptin 50mg/604원, 100mg/910원, 1일 1회 100mg, 부-비인두염, 상기도감염, 두통, 복통, 구역, 설사, 저혈당증, 전체 월 원내사용량-59-9-62-31)	단독생산	○
6	내과	슈가논정5밀리그램(에보글립틴타르타르산염)_(6.869mg/1정)	evogliptin tartrate(as evogliptin 5mg)	1	정	737	동아에스티(주)	Dipeptidyl Peptidase IV (DPP-IV) Inhibitor	제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제(단독요법으로 투여, 메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 본제를 병용요법으로 투여)	1일 1회 5mg(최대) 투여. 식사와 관계없이 투여	코인두염, 관절통, 위염, 치통, 접촉성 피부염	트라젠타정(베링거, linagliptin 5mg/752원, 1일 1정, 부-알레르기반응, 관절통, 복통, 저혈당 증상, 월 원내사용량-1102-939-889-1099) 제미글로정50밀리그램(LG, gemigliptin 50mg/772원, 1일 1정, 부-저혈당, 관절통, 코인두염, 세균뇨, 월 원내사용량-66-12-5-30)	원외처방전용	○

[illegible]

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X				
16	내과	엔트레스토피름 코팅정50밀리그램 (사쿠비트릴·발사르탄나트륨염수화물)_(56.551mg/1정)	sacubitril/valsartan sodium hydrate (as sacubitril/valsartan) 50mg	1	정	2,243	한국노바티스(주)	Angiotensin II Receptor Blocker; Neprilysin Inhibitor	만성 심부전(좌심실 수축기능이 저하된 만성 심부전 환자(NYHA class II-IV)에서 심혈관 질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험성 감소), 안지오텐신 수용체 길항제 (ARB) 또는 안지오텐신전환효소 (ACE) 억제제를 대신하여 다른 심부전 치료제와 병용 투여	1일 2회(안지오텐신 수용체 길항제 (ARB)와 병용해서는 안됨, 혈관 부종의 위험성으로 안지오텐신전환효소(ACE) 억제제와 병용해서는 안됨, 안지오텐신전환효소 (ACE) 억제제 투여 중단 36시간 이후에 이 약의 투여를 시작)	신부전, 저혈압, 혈청 칼륨 증가, 고칼륨혈증, 혈청 크레아티닌 증가	** 복지부고시 고시 제2017-180호(2017-10-01) 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아래 - 가. 좌심실 수축기능이 저하된 만성 심부전 환자(NYHA class II ~ IV)중, 좌심실 박출률(LVEF:Left Ventricular Ejection Fraction)이 35% 이하인 환자로서 - ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제를 표준치료(베타차단제, aldosterone antagonist 등)와 병용하여 4주 이상 안정적인 용량(stable dose)으로 투여 중인 경우 나. ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제와의 병용투여는 인정하지 아니함. (※ 동 약제는 ACE 억제제 또는 Angiotensin II 수용체 차단제를 대체하여 사용함.) 필요시 구입	단독생산	○				
17	내과	엔트레스토피름 코팅정100밀리그램 (사쿠비트릴·발사르탄나트륨염수화물)_(0.113103g/1정)	sacubitril/valsartan sodium hydrate (as sacubitril/valsartan) 0.1g	1	정	2,243									○			
18	내과	엔트레스토피름 코팅정200밀리그램 (사쿠비트릴·발사르탄나트륨염수화물)_(0.226206g/1정)	sacubitril/valsartan sodium hydrate (as sacubitril/valsartan) 0.2g	1	정	2,243									○			
19	내과	리바로브이정 2/80밀리그램 (1정)	pitavastatin calcium 2mg valsartan 80mg	1	정	1,086	제이더블유중외제약(주)	Antilipemic Agent(HMG-CoA Reductase Inhibitor), Antihypertensive(Angiotensin II Receptor Blocker)	본제는 두 약물 (피타바스타틴칼슘, 발사르탄)을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용	1일 1회	두통, 구역, 가슴 불편감, 땀증가	제형추가(리바로정 pitavastatin calcium 2mg/554원, 4mg/838원, 발사렉트정 valsartan 80mg/477원, 160mg/519원, 160mg 월 원내 사용량-29-14-11-19 듀오웰정(telmisartan 40mg, rosuvastatin 10mg/1,028원, 월 원내사용량-58-58-58-58, 80/10/1,185원) 원외	단독생산	○				
20	내과	리바로브이정 2/160밀리그램 (1정)	pitavastatin calcium 2mg valsartan 160mg	1	정	1,268												○
21	내과	리바로브이정 4/80밀리그램 (1정)	pitavastatin calcium 4mg valsartan 80mg	1	정	1,366												○
22	내과	리바로브이정 4/160밀리그램 (1정)	pitavastatin calcium 4mg valsartan 160mg	1	정	1,548												○
23	내과	아토젯정10/10밀리그램 (1정)	atorvastatin calcium(as atorvastatin 10mg), ezetimibe 10mg	1	정	1,099	한국엠에스디(유)	Antilipemic Agent(HMG-CoA Reductase Inhibitor, 2-Azetidinone)	원발성 고콜레스테롤혈증, 동형접합 가족형 고콜레스테롤혈증	1일 1회	근육통, 복통, 간효소 상승	제형추가(화이자, 리피토정10mg/139원, 20mg/138원) 로바젯정(CJ, ezetimibe 10mg rosuvastatin 5mg/895원, 10/10/1,251원, 10/20/1,263원, 전체 월 원내사용량-177-142-114-250) 원외	단독생산	○				
24	내과	아토젯정10/20밀리그램 (1정)	atorvastatin calcium(as atorvastatin 20mg), ezetimibe 10mg	1	정	1,393												○
25	내과	아토젯정10/40밀리그램 (1정)	atorvastatin calcium(as atorvastatin 40mg), ezetimibe 10mg	1	정	1,499												○
26	내과	베를리디정(테노포비르알라페나미드푸마르산염)_(28.04mg/1정)	tenofovir alafenamide fumarate (as tenofovir alafenamide 25mg)	1	정	3,754	길리어드사이언스코리아(유)	Antihepadnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HBV)	성인의 만성 B형 간염 치료	성인, 1일 1회 1정 식사와 함께 복용	두통, 복통, 피로, 기침, 오심, 요통	비리어드정(tenofovir disoproxil fumarate 300mg(as tenofovir disoproxil 245mg)/4,850원, HIV-1 감염, 만성B형간염, 1일 1정, 부-물면증, 두통, 통증, 어지럼증, 우울증, 발진(황반변성, 농포성 또는 수포성 발진, 가려움증, 두드러기), 가려움증, 고콜레스테롤혈증, 혈중중성지방 상승, 복부통증, 오심, 설사, 구토, 골밀도 감소, creatine phosphokinase 증가, 허약, 발열) 원외	단독생산	○				

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X
27	내과	닥사스정500마이크로그램(로플루밀라스트)(0.5mg/1정)	roflumilast(micronized) 0.5mg	1	정	1,227	한국다케다제약(주)	Phosphodiesterase-4 Enzyme Inhibitor	기관지확장제의 부가요법제로서, 증상악화 병력이 있고, 만성기관지염을 수반한 중증의 만성폐쇄성 폐질환의 유지요법제	18세 이상: 식사와 관계 없이 1일 1회 1정	설사, 체중 감소, 오심, 복통 및 두통	** 복지부고시 고시 제2015-184호(2015-11-01) 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에 투여한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담로록 함. - 아래 - 가. 투여대상 증상악화 병력이 있고 만성기관지염을 수반한 중증의 만성폐쇄성폐질환 1) FEV1 값이 예상 정상치의 50% 미만인 경우 또는 2) 베타-2 작용제나 항콜린제 등의 지속 투여에도 연 2회 이상 급성악화*가 발생한 경우에는 투여조건서 참조하여 인정 ※ 급성악화는 호흡곤란의 악화, 기침의 증가, 가래량의 증가 또는 가래색의 변화 등으로 약제의 변경 또는 추가(항생제·스테로이드제 등)가 필요한 경우를 말함. 나. 투여방법: 지속성 기관지확장제(LABA 또는 LAMA) 1종과 병용 투여	단독생산	○
28	내과	인반즈주1그램(에르타페넴나트륨)(1.046g/1병)	ertapenem sodium (as ertapenem 1g)	1	병	38,266	한국엠에스디(유)	Antibiotic (Carbapenem)	복잡성 복부내 감염, 복잡성 피부 및 피부조직 감염(성인에서 골수염 동반하지 않은 당뇨병 족부 감염 포함), 지역사회 획득성 폐렴, 복잡성 요로 감염, 급성 골반 감염(분만후 자궁실질내막염, 패혈성유산, 수술후 부인과 감염 등), 계획된 직장결장수술로 인한 수술부위 감염 예방(성인)	성인(13세 이상)-1.0g 1일 1회. 정주는 14일, 근주는 7일까지 투여, 소아(3개월-12세)-15mg/kg, 1일 2회	설사, 주사부위 혈관 합병증, 구역, 두통, 질염, 정맥염/혈전성정맥염, 구토	유한메로펜주사(meropenem 0.5g/9,963원, 패혈증, 표재성 화농성질환, 림프절염, 항문주위농양, 외과 정형외과영역 감염증(골수염, 관절염, 창상감염), 호흡기 감염증(폐렴, 편도주위농양, 만성호흡기질환의 2차감염, 폐화농양, 농흉), 요로감염증(신우신염, 복잡성방광염), 간 담도감염증(담낭염, 담관염, 간농양), 복막염, 산부인과영역 감염증(자궁부속기염, 자궁내감염, 자궁방결합직염), 이비과영역 감염증(중이염, 부비동염), 세균성 수막염(3개월 이상의 소아), 호중구 감소증 환자에서의 의심되는 감염, 남포성 섬유증, 1-6g/2-3회/day, 부- 말초혈관 질환, 두통, 통증, 발진, 소양증, 설사, 구역/구토, 변비, 구강 칸디다증, 설염, 빈혈, 무호흡증, 주사부위의 염증, 정맥염/혈전정맥염)	단독생산	○
29	내과, 신경과	카발린캡슐25밀리그램(프레가발린)(25mg/1캡슐)	pregabalin 25mg	1	캡슐	275	씨제이헬스케어(주)	Anticonvulsant(GABA Analog)	성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료, 간질(성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제), 섬유근육통의 치료	1일 2~3회, 7일간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량가능	어지러움, 졸음, 두통, 구역, 설사, 구강건조, 부종, 현훈, 구토, 말초부종, 떨림, 경련악화	제형추가(화이자, 리리카캡슐 75mg/528원, 150mg/674원, 300mg/894원)	단독생산	○
30	내과, 신경과	카발린캡슐50밀리그램(프레가발린)(50mg/1캡슐)	pregabalin 50mg	1	캡슐	439	씨제이헬스케어(주)	Anticonvulsant(GABA Analog)	성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료, 간질(성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제), 섬유근육통의 치료	1일 2~3회, 7일간격으로 1일 최대 600 mg까지 증량가능	어지러움, 졸음, 두통, 구역, 설사, 구강건조, 부종, 현훈, 구토, 말초부종, 떨림, 경련악화	제형추가(화이자, 리리카캡슐 75mg/528원, 150mg/674원, 300mg/894원) 원외 (신경과 확인)	단독생산	○
31	비뇨기과	구구탐스캡슐(1캡슐)	tadalafil 5mg+tamsulosin hydrochloride 0.4mg	1	캡슐	1,300	한미약품(주)	Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitor + Alpha 1 Blocker	양성 전립선 비대증과 발기부전 치료를 위해 탐스로신염산염과 타다라필의 병용 투여를 대체	1일 1회	두통, 안구충혈, 비충혈, 홍조, 어지럼증, 근육통, 역사정	비급여 제형추가(시알리스정 5mg, 한미탐스캡슐 0.4)	원외처방전용	○
32	산부인과	라본디캡슐(1캡슐)	raloxifene hydrochloride (as raloxifene 55.71mg) cholecalciferol concentrated powder (as vitamin D3 800IU)	1	캡슐	705	한미약품(주)	Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) + Vitamin D Analog	폐경 후 여성의 골다공증 치료 및 예방	1일 1회 1캡슐	관절통, 홍조, 감염, 독감 증상	제형추가(에비스타정(raloxifene 55.71mg/705원) + Vitamin D Analog)	원외처방전용	○
33	소아청소년과	트레스탄츄어블정	cyanocobalamin 0.5mg+cyproheptadine orotate 0.75mg+dl-carnitine hydrochloride 75mg+L-lysine hydrochloride 75mg	1	정	330	삼진제약(주)	APPETITE STIMULANT	식욕부진, 성장부진	성인: 1회 2정, 1일 2회(식전), 8일간, 씹어서 복용. 이후 1회 4정 1일 2회. 7-12세: 1일 1회(저녁 식전) 2정, 8일간, 씹어서 복용. 이후 1회 2정 1일 2회. 3-6세: 1일 1회(저녁 식전) 1정, 8일간, 씹어서 복용. 이후 1회 1정 1일 2회.	졸음(과민성 환자), 두통, 구역, 구갈	비급여 제형추가(트레스탄캡셀/380원, 비급여)	원외처방전용	○

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X
34	소아 청소 년과	폴락스산(마크 로글4000)	macrogol 4000 10g	1	포	780	안국 약품 (주)	Laxative, Osmotic(Polyethyle ne glycol)	8세 이상 소아 및 성인의 변비증상 치료	성인 및 8세 이상 소아: 1일 1~2포, 증상에 따라 특히 소 아의 경우 격일 1포 복용 가 능. 한 컵의 물에 1포를 넣어 복용. 오전 복용 권장. 소아 에 3개월이상 투여하지 않음	복통 및 복부팽만, 설사, 구 역	비급여 포탈락산(lactitol monohydrate 20g/포/334원, 변비, 1일 1회 성인 20~10g, 소아 0.25g/kg/day, 부-산.염기 장애, 설사, 복부팽만 또는 고창, 복통, 근육경련, 오심, 소화불량, 상복부통, 배변긴박감)	원외 처방 전용	○
35	신 경 과	리렙피디정2밀 리그램(로파니롤염산 염)_(2.28mg/1정)	ropinirole hydrochloride (as ropinirole 2mg)	1	정	912	(주) 글락 소스 미스 클라 인	Anti- Parkinso n Agent, Dopamin e Agonist	특발성 파킨슨씨병의 치 료: 특발성 파킨슨씨병 치료에 단독 요법 사용 가능, 레보도파와 병용투 여는 on-off 현상을 억제 하고 레보도파의 1일 투 여량을 줄일 수 있음	초기 처음 1주간 1일 1회 2mg, 매주 또는 2주 이 상의 간격으로 2mg씩 단 계적 증량, 증상이 조절 되는 최소용량으로 투여 지속, 1일 최대 24mg	실신, 졸음, 어지러움, 피로, 구역, 구토, 바이 러스 감염	제형추가(명인, 파키닐정0.25mg/184원, 1mg/464원)	원외 처방 전용	○
36	신 경 과	리렙피디정4밀 리그램(로파니롤염산 염)_(4.56mg/1정)	ropinirole hydrochloride (as ropinirole 4mg)	1	정	1,388								○
37	신 경 과	미가드정 2.5mg(프로바 트립탄속신산염 일수화 물)_(3.91mg/1 정)	frovatriptan succinate monohydrate (as frovatriptan 2.5mg)	1	정	3,428	에스 케이 데미 칼 (주)	Antimigr aine Agent;Se rotonin 5-HT1B, 1D Receptor Agonist (바나나 26)	전조증상을 수반 하거나 수반하지 않는 편두통의 급 성치료	성인(18~65세): 프 로바트립탄으로서 2.5mg(1정). 재발 시 2시간 이상 간격 두고 재투여. 1일 최대 5mg(2정)(본제는 편 두통 예방 목적으로 복용하지 않음)	어지럼증, 피로, 감 각이상, 두통 및 홍조	수마트란정50mg(명인, sumatriptan 50mg/1정/2,742원, 전조증이 수반되거나 수반되지 않는 편두통의 조속한 완화, 여성의 생리주기와 관련한 편두통의 조속한 완화, 성인 1회 50mg, 필요시 100mg, 투여간격 최소 2시간, 1일 최대 300mg, 부-홍통, 홍부 압박감, 현기증, 졸음, 피로, 두통, 현훈, 원인 불분명의 통증, 편두통, 불면, 오심, 구토, 침분비 저하, 인후, 턱의 통증, 마비감, 열감 또는 냉감, 원인 불분명의 압박감) 알모그란정(유한, 원외처방전용, almotriptan 12.5mg/1정/3,659원, 성인의 전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성치료, 15세 이상 청소년의 전조증상을 수반하거나 수반하지 않고, 치료없이 4시간 이상 지속되는 편두통의 통증 급성치료, 성인 편두통 발현시 1정, 24 시간내 재발시 1정 재투여, 재투여는 최초 투여와 최소 2시간 이상의 간격. 1일 최대 25mg(2정). 15세 이상 청소년: 편두통 발현시 1정, 부-두통, 어지러움, 졸음, 오심, 구강건조증, 감각이상, 관상동맥경축, 일과성 심근경색증, 심근허혈, 심실성빈맥, 심실세동)	원외 처방 전용	○
38	신 경 과	종근당글리아티 린연질캡슐(콜린 알포세레이트)_(0.4g/1캡 슐)	choline alfoscerate 0.4g	1	캡슐	518	(주) 종 근 당	Acetylcholine 전구 체(신경전달물질인 Acetylcholine (ACh)의 생합성에 있어 Choline을 제 공하는 전구체)	뇌혈관 결손에 의한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행 성 뇌기질성 정신증후군, 감각 및 행동변화, 노인 성 가성우울증	1일 2~3회	위염, 위질환, 졸음, 불면, 적개심, 신경 질, 경련, 운 동과다	제형추가(유한, 알포아티린정, 508원)	원외 처방 전용	○
39	신경과, 재활의학과, 신경외과	아피다몰서방캡 슐_(0.707g/1 캡슐)	aspirin 25mg dipyridamole 0.2g	1	캡슐	304	제 일 약 품 (주)	Antiplatelet Agent(Va sodilator)	뇌의 일과성 허혈 또는 혈전에 의한 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자의 뇌 졸중 재발에 대한 위험성 감소	성인 1회 1캡슐, 1일 2회	현기증, 두통, 발 진, 소화 불량	프레탈정(오츠카, cilostazol 50mg/243원, 100mg/473원, 만성동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말 초혈관병증 등)에 따른 궤양, 동통 및 냉감 등 허혈성 제증상 의 개선, 뇌경색(심인성뇌색전증 제외) 발증 후 재발억제, 1 일 2회, 부-두통, 비정상적 대변, 설사, 비염, 감염)	현대(디피 아복서방 캡슐/304 원), 고려 (스트록스 타서방캡 슐/304원), 초당(아디 복스린 캡슐/304원)	○
40	외 과	오마프원페리주 _(724mL)	(A액228mL)Calcium chloride dihydrate 0.17g glycine 2.51g L-alanine 3.19g L-arginine 2.736g L-histidine 0.684g L-isoleucine 1.14g L-leucine 1.687g L-lysine acetate 2.12g L-methionine 0.98g L-phenylalanine 1.163g L- proline 2.554g L-serine 1.48g L- threonine 1g L-tryptophan 0.456g L- tyrosine 90mg L-valine 1.414g magnesium sulfate heptahydrate 0.563g potassium chloride 1.02g sodium acetate trihydrate 1.28g sodium glycerophosphate 0.95g taurine 0.23g zinc sulfate heptahydrate 5mg (B액394mL)Glucose monohydrate (as glucose 61.22g) (C액102mL)Medium-chain triglycerides 6.12g purified fish oil 3.06g purified olive oil 5.10g purified soybean oil 6.12g	724	mL /백	24,163	씨 제 이 헬 스 케 어 (주)	Parenteral Nutritional Product- Combination(아미노산 과 포도당, 지질의 혼합 제제), 500kcal	경구 또는 위장관 영 양공급이 불가능, 불 충분하거나 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 2세 이 상의 소아 및 성인에 게 칼로리, 아미노산, 필수지방산 및 오메 가-3 지방산의 보급	말초 또는 중심정 맥으로 정맥내 점 적주입	혈전성 정맥 염, 체온의 경미한 상 승, 식욕부 진, 구역, 구 토, 혈장 간 효소 수치증 가, 오한, 두 통, 어지러 움	제형추가(오마프원페리주500mL/15,464원, 구입가 13,917원, 350kcal, 월 사용량-38-117-88-61) 페리올리멜엔4이주1000mL(박스터, 25,618원, 구입 가 25,361원, 700kcal, 월 사용량-313-277-376- 382) 뉴트리플렉스리피드페리주사1250mL(비브라운, 25,063원, 구입가 21,303원, 955kcal, 월 사용량- 26-22-5-14) 위너프페리주1450mL(JW, 49,833원, 구입가 42,358원, 1001kcal, 월 사용량-206-297-189- 154)	단 독 생 산	○

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X
41	정신건강의학과	프리스틱서방정 50밀리그램 (데스벤라팍신속산염일수화물)_(75.87mg/1정)	desvenlafaxine succinate monohydrate (as desvenlafaxine 50mg)	1	정	1,008	한국화이자 제약(주)	Antidepressant(Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitor)	주요 우울증	1일 1회 50~200mg	어지럼증, 불면증, 다한증, 메스꺼움, 입마름	벤라팩트서방캡슐(삼천당, venlafaxine 37.5mg/460원, 75mg/690원, 우울증, 사회공포증, 1일 1회 37.5 ~ 225mg, 부-두통, 불면증, 졸림, 현기증, 신경과민, 오심, 구강건조증, 식욕부진, 변비, 비정상적인 사정/극치감, 쇠약, 발한)	단독생산	○
42	정신건강의학과	프리스틱서방정 100밀리그램 (데스벤라팍신속산염일수화물)_(0.15177g/1정)	desvenlafaxine succinate monohydrate (as desvenlafaxine 100mg)	1	정	1,257	한국화이자 제약(주)	Antidepressant(Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitor)	주요 우울증	1일 1회 50~200mg	어지럼증, 불면증, 다한증, 메스꺼움, 입마름	벤라팩트서방캡슐(삼천당, venlafaxine 37.5mg/460원, 75mg/690원, 우울증, 사회공포증, 1일 1회 37.5 ~ 225mg, 부-두통, 불면증, 졸림, 현기증, 신경과민, 오심, 구강건조증, 식욕부진, 변비, 비정상적인 사정/극치감, 쇠약, 발한)	단독생산	○
43	정신건강의학과	아칸솔정 400mg(아미של 프리드)_(0.4g/1정)	amisulpride 0.4g	1	정	1,113	(주)한국파마	Antipsychotic Agent, Atypical(presynaptic D2/D3 dopamine receptor)	정신분열병 라병인 처방 필요	성인 1일 400mg 이하는 1일 1회, 1일 400mg 초과시 1일 2회. 급성 정신질환의 경우 1일 최대 1,200mg. 음성증상 우세시 1일 50~300mg. 최적 1일 100mg. 양성·음성증상 혼합시 초기 1일 400~800mg, 이후 환자 반응에 따라 용량 조절	추체외로 증상 (진전, 경직, 운동감소증, 타액 분비항진, 정좌불능, 운동이상증), 서맥, 저혈압, 심계항진, 월경 이상, 유즙 분비, 유방통, 유방 비대, 체중 증가, 오심, 구토, 소화 불량, 구강 건조, 변비, 불안증, 두통, 불면, 운동항진증, 파킨슨 증상, 안면 마비, 원근 조절 마비, 불규칙적 월경, 무월경, 성기능 장애	리페리돈정(한인, risperidone 1mg/279, 2mg/446원, 정신분열병, 중등도-중증 알츠하이머형 치매 환자의 초조, 공격성 또는 정신병 증상의 단기치료(6주까지), 양극성장애와 관련된 조증삽화의 치료를 위한 기분안정제의 부가요법, 파괴적 행동이 두드러지는 정신지체 또는 평균 이하의 지적 능력을 갖는 소아, 청소년 및 성인의 행동장애와 기타 파탄적 행동장애의 치료, 1일 0.25~6mg 1~2회, 부-두통, 통증, 발진, 설사, 복통, 요도감염, 관절통, 등통증) 로나센정(부광, blonanserin 2mg/354원, 4mg/507원, 8mg/787원, 정신분열증, 1일 최대 24mg 2회 분복, 부-멀림, 운동원만, 침분비, 파다 등의 증상을 포함하는 파킨슨 증후군, 정좌불능증, 불면증, 프로락틴 상승, 운동장애, 졸음, 불안/초조감/화를 잘냄) 쿼에타핀정(한인, quetiapine 25mg/278, 100g/680원, 200mg/979원, 정신분열병, 양극성장애(양극성장애 1형과 관련된 조증삽화의 급성 치료, 양극성장애의 우울삽화의 급성 치료, 쿼에티아핀 투여로 조증, 혼재 또는 우울삽화에 반응을 보인 자들에 있어서, 양극성장애의 재발방지), 1일 1~3회 800mg까지, 부-졸림, 어지러움, 구강건조, 경미한 무력증, 변비, 빈맥, 기립저혈압, 소화불량) 자이레핀정(한인, olanzapine 5mg/693원, 10mg/1,105원, 정신분열병, 양극성 장애(양극성장애 1형과 관련된 조증 및 혼재삽화 치료, 양극성 장애에 있어서 재발방지, 정신분열병과 양극성 장애 1형과 관련된 조증 및 혼재삽화의 치료, 양극성장애에 있어서 재발 예방, 양극성장애 1형과 관련된 우울삽화의 급성 치료, 1일 1회 5~20mg, 부-졸음과 체중증가, 호산구증가증, 프로락틴, 콜레스테롤, 혈당 및 중성지방 수치 상승, 당뇨, 식욕 증가, 정좌불능증, 파킨슨증, 백혈구감소증, 중성구감소증, 운동 이상증, 기립성 저혈압, 항콜린 작용, 간 트랜스아미나제의 일시적인 증가가 없는 상승, 발진, 무력증, 피로, 발열, 관절통, 알칼리 인산분해효소 증가, 감마 글루타미드 전이효소(GGT) 상승, 요산 상승, 크레아티닌 산화효소 상승, 부증)	한독(솔리안정 400밀리그램/1,204원)	○
44	정신건강의학과	에탈로프정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정)	escitalopram oxalate (as escitalopram 5mg)	1	정	410	동화약품(주)	Antidepressant, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor	주요우울장애, 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애, 사회불안장애(사회공포증), 범불안장애, 강박장애의 치료	1일 최대 20mg. 1일 1회(아침 또는 저녁)	두통, 기면, 불면증, 오심, 발기부전	제형추가(산도스에스시탈로프람정10mg/472원, 20mg/760원)	한국론드백(백사프로정5밀리그램/406원), 한국산도스(산도스에스시탈로프람정5밀리그램/349원)	○
45	정신건강의학과	쿼에타핀정 12.5밀리그램 (쿼에티아핀푸마르산염)_(14.39mg/1정)	quetiapine fumarate (as quetiapine 12.5mg)	1	정	170	한인 제약(주)	Second Generation (Atypical) Antipsychotic	정신분열병, 양극성장애(양극성장애 1형과 관련된 조증삽화의 급성 치료, 양극성장애의 우울삽화의 급성 치료, 쿼에티아핀 투여로 조증, 혼재 또는 우울삽화에 반응을 보인 자들에 있어서, 양극성장애의 재발방지)	1일 1 - 3회 800mg까지	졸림, 어지러움, 구강건조, 경미한 무력증, 변비, 빈맥, 기립저혈압, 소화불량	제형추가(25mg/278원, 100mg/680원, 200mg/979원)	단독생산	○

번호	신청과	제품명	성분	규격	단위	상한가	제약회사명	약효분류	효능·효과	용법·용량	부작용	비고-원내유사효능약품	(경합)	O.X
46	정신건강의학과	디만틴정5밀리그램 (메만틴염산염)_(5mg/1정)	memantine hydrochloride 5mg	1	정	503	현대약품(주)	N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antagonist	중등도에서 중증의 알츠하이머병 치료	1일 최대용량은 5(1회)~20mg(2회)	어지러움, 두통, 변비, 졸림, 고혈압	제형추가(에자틴정10mg/832원, 알보젠)	단독생산	○
47	정신건강의학과	환인메만틴오디정5밀리그램 (메만틴염산염)_(5mg/1정)	memantine hydrochloride 5mg	1	정	563	환인제약(주)	moderate-to-severe dementia of the alzheimer's type)					단독생산	×
48	정신건강의학과	환인메만틴오디정10밀리그램 (메만틴염산염)_(10mg/1정)	memantine hydrochloride 10mg	1	정	845	환인제약(주)	of the alzheimer's type)					단독생산	×
49	정형외과	낙소졸정 500/20밀리그램_(1정)	esomeprazole strontium tetrahydrate (as esomeprazole 20mg) naproxen 0.5g	1	정	445	한미약품(주)	Analgesic(NSAID), Proton Pump Inhibitor	NSAID 관련 위·십이지장궤양 발생 위험이 있으면서 저용량 나프록센 또는 타 NSAID에 의해 충분치 않은 자에서의 골관절염, 류마티스성 관절염, 강직성척추염 증상 치료	1회 1정, 1일 2회	부종, 어지럼증, 졸음, 두통, 가려움, 피부발진, 반상출혈, 수분저류, 복통, 변비, 오심, 가슴쓰림, 중독, 반상출혈, 이명, 호흡곤란, 발한, 갈증, 청각장애, 시각장애, 설사, 소화불량, 위염, 고창, 자반증, 현기증, 심계항진	제형추가(종근당, 아나프록스정 naproxen sodium 0.275g/115원, 에소메졸캡슐 esomeprazol 20mg/966원-원외처방전용)	원외처방전용	○
50	정형외과	뉴신타서방정 50밀리그램 (타펜타돌염산염)_(58.24mg/1정)	tapentadol hydrochloride (as tapentadol 50mg)	1	정	757	(주)한국안센	Analgesic-Opioid	장시간 지속적인 마약성 진통제 치료를 필요로 하는 중증 만성 통증의 완화(비암성통증대상-골관절염, 하부요통, 신경병성통증-1일 300mg까지 급여)	1일 2회	구역, 어지러움, 구토, 졸음, 두통	마약 타진서방정(먼디, Oxycodone HCl 10mg, aloxone hydrochloride 5mg/1정/1,141원, 20/10mg/1,610원, 40/20mg/2,281원, 마약성 진통제의 사용을 필요로 하는 중등증-중증의 통증-비암성통증대상-골관절염, 하부요통, 신경병성통증, 만성 체장염-1일 60mg까지 급여, 1일 2회, 부-식욕 감소, 불면증, 어지럼증, 두통, 졸음, 경련, 주의력 장애, 언어 장애, 실신, 진전, 현기증, 안면 홍조, 복통, 변비, 설사, 구갈, 소화불량, 구토, 구역, 고창, 가려움증, 발진, 다한증, 무력 상태, 피로)	단독생산	
51	정형외과	뉴신타서방정 100밀리그램 (타펜타돌염산염)_(0.11648g/1정)	tapentadol hydrochloride (as tapentadol 0.1g)	1	정	1,174								
52	정형외과	뉴신타아이알정 50밀리그램 (타펜타돌염산염)_(58.24mg/1정)	tapentadol hydrochloride (as tapentadol 50mg)	1	정	528	(주)한국안센	Analgesic-Opioid	마약성 진통제 사용을 필요로 하는 중등증 내지 중증의 급성 통증의 완화(비암성통증대상-골관절염, 하부요통, 신경병성통증-1일 300mg까지 급여)	초회 4-6시간마다 50mg(환자의 통증강도 및 기존 투여제에 따라 75mg 혹은 100mg 가능), 통증 조절 실패시 첫 투여 1시간후 두 번째 투여. 이후 일반적으로 50-100mg을 4-6시간마다 투여, 시작용량 1일 최대 700mg, 유지용량 1일 최대 600mg	구역, 어지러움, 구토, 졸음, 두통	마약 아이알코돈정5밀리그램(먼디, oxycodone HCl 5mg/1정/390원, 마약성 진통제 사용이 필요한 중등도 및 심한 통증의 완화-비암성통증대상-골관절염, 하부요통, 신경병성통증, 만성 체장염-1일 60mg까지 급여, 부-의존성, 호흡억제, 두부손상과 두개내압 상승, 혈압저하 및 속, 착란, 순환기계 저하, 심장마비, 무기폐, 기관지 경련, 후두부종, 마비성 장폐색증, 중독성 거대결장, 아나필락시양 반응)	단독생산	보류