

대체약

| 번호 | 신청과       | 품명                                                 | 성분                                                                                                           | 규격 | 단위                | 상한가   | 제약회사명                        | 효능효과                                                       | 용법·용량                                                                                                                                                                                                               | 부작용                                                                                                              | 본원대체품목                                                                                                                                                                                                                     | 경합추천                                           | O,X                   |
|----|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 내과        | 메이킨큐<br>장용정                                        | Bisacodyl<br>5mg+Cas<br>anthranol<br>14mg+Do<br>cusate<br>Sodium<br>14mg+Urs<br>odeoxych<br>olic Acid<br>6mg | 1  | 정                 | 165   | 명<br>인<br>제<br>약<br>(주)      | 변비, 변비에 따<br>른 다음 증상의<br>완화(식욕부진,<br>복부팽만, 장내<br>이상발효, 치질) | 1일 1회 취침 시 복용(만 15세 이<br>상: 1회 1-3정, 만 11-14세: 1회<br>1-2정, 만 8-10세: 1회 1정)                                                                                                                                          | 발진·충혈되어 붉어<br>짐, 가려움, 심한 복<br>통(배 아픔), 설사,<br>구토, 복부불쾌감,<br>경련                                                   | 신일비사코딜정(bisacodyl<br>5mg/29원, 급만성 변비, 수술전<br>후, 장내분변제거, X-선 촬영시 장<br>내분변 제거, 성인: 1일 1회<br>10~15mg 취침시 복용, 부-혈관<br>부종(부기), 아나필락시스 증상과<br>같은 과민반응, 경련이나 배아픔과<br>같은 복부(배부분)불쾌감, 설사,<br>구역, 구토, 배뇨감, 두통, 요통,<br>어지럼 또는/그리고 실신) | 단독생<br>산                                       | <input type="radio"/> |
| 2  | 비뇨<br>기과  | 미노페시<br>아정1밀리<br>그램(피나<br>스테리드)                    | finasteride<br>1mg                                                                                           | 1  | 정                 | 1,000 | 현<br>대<br>약<br>품<br>(주)      | 성인 남성(만<br>18-41세)의 남<br>성형 탈모 치료                          | 1일 1회 1mg, 식사와 관계없이 투<br>여                                                                                                                                                                                          | 성욕감퇴, 발기부전,<br>사정장애, 사정액감<br>소                                                                                   | 프로페시아정1밀리그램(msd,<br>1800원)                                                                                                                                                                                                 | 원외처<br>방전용                                     | <input type="radio"/> |
| 3  | 응급<br>의학과 | 동아페르<br>디핀주사<br>액(니카르<br>디핀염산<br>염)(10mg<br>/10mL) | nicardipin<br>e<br>hydrochlor<br>ide<br>10mg(1m<br>g/mL)                                                     | 10 | m<br>L/<br>앰<br>플 | 2,124 | 동<br>아<br>에<br>스<br>티<br>(주) | 수술시 이상고혈<br>압의 구급처치,<br>응급성 고혈압증                           | 수술시 이상고혈압의 구급처치-<br>0.01-0.02%(0.1-0.2mg/mL) 희<br>석액을 2-10 $\mu$ g/kg/min 속도로 점<br>적정주. 급속한 혈압강하 필요시<br>이약 그대로 10-30 $\mu$ g/kg 정주, 응<br>급성 고혈압증-0.01-0.02%(0.1-<br>0.2mg/mL) 희석액을 0.5-6<br>$\mu$ g/kg/min 속도로 점적정주 | 빈맥, 심전도변화,<br>혈압저하, BUN 상<br>승, 크레아티닌 상<br>승, 마비성 장폐색<br>증, 저산소혈증, 폐<br>수종, 호흡곤란, 협<br>심증, 혈소판 감소,<br>간기능 장애, 황달 | 휴온스니카르디핀주(nicardipine<br>hydrochloride<br>20mg(1mg/mL)20mL/3,236원)                                                                                                                                                         | 니칼핀<br>주사액<br>(일동<br>제약<br>(주),<br>2,318<br>원) | <input type="radio"/> |