

대체약

번호	신청과	품명	성분	규격	단위	상한가	업소명	효능효과, 용법·용량, 부작용	본원대체품목	경합추천	O.X
1	가정의학과	리세닐정35밀리그램(무수리세드론산나트륨)_(35mg/1정)	risedronate sodium 35mg	1	정	5,067	(주)메디카코리아	폐경 후 여성의 골다공증 치료와 예방, 남성의 골다공증 치료 성인: 주 1회 35mg(아침식사 최소 30분 전 또는 하루 중에 어떤 때라도 음식물이나 음료수의 섭취 전후로 최소 2시간 간격을 두고 똑바른 자세로 충분한 양의 순수한 물(170-230mL)과 함께 복용하며 씹거나 빨아먹어서는 안됨. 복용 후 최소 30분 동안 눕지 말아야 함) 부-두통, 통증, 발진, 설사, 복통, 오심, 요로감염, 관절통, 요통	악토넬EC정35밀리그램(한독, 리세드론산나트륨2.5수화물)_(35mg/1정/5,066원)	악토넬정35밀리그램(리세드론산나트륨)_(35mg/1정/5,057, (주)한독)	○
2	내과	동아가스터정20밀리그램(파모티딘)_(20mg/1정)	famotidine 20mg	1	정	182	동아에스티(주)	위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, Zollinger-Ellison증후군: 1회 20mg 1일 2회 또는 1일 1회 40mg 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기 1회 10mg 1일 2회 또는 1일 1회 20mg 부-두통, 변비, 설사, 현기증	가스터디정20mg(파모티딘)_(20mg/1정/271원)	한미파모티딘정(파모티딘)_(20mg/1정/189원)	○
3	내과	레나메진캡슐(구형흡착탄)_(0.2857g/1캡슐)	spherical adsorptive carbon 0.2857g	1	캡슐	243	대원제약(주)	만성신부전(진행성)에 대한 요독증 증상의 개선 및 투석도입의 지연 성인 1회 구형흡착탄 2g(7캡슐), 1일 3회 부-변비, 식욕부진, 구역·구토, 복부팽만감	씨제이크레메진세립(구형흡착탄)_(2g/2g)(spherical adsorptive carbon 2g/포/1,884원, 원외처방전용)	원외처방전용	○
4	비뇨기과	후리패스캡슐(실로도신)_(4mg/1캡슐)	silodosin 4mg	1	캡슐	193	한국휴텍스제약(주)	전립선 비대증에 수반하는 배뇨장애 성인: 1회 4mg, 1일 2회(아침·저녁 식후) 또는 1일 1회(식사와 함께) 8mg 부-사정장애(역행성사정 등), 구갈, 설사, 묽은 변, 기립성 어지러움, 코막힘, 현기증, 어지러움, 두통	트루패스정4밀리그램(중외, 실로도신)_(4mg/1정/193원)	티로도신캡슐4밀리그램(실로도신)_(4mg/1캡슐/193원, 한국맥네티(주))	○
5	비뇨기과, 신경과	팜비어정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정)	famciclovir 0.25g	1	정	3,765	일동제약(주)	성인: 대상포진 감염증 치료: 1회 250mg, 1일 3회 7일간. 초발성 생식기포진 감염증 치료: 1회 250mg, 1일 3회 5일간. 급성 재발성 생식기포진 감염증 치료: 1회 125mg, 1일 2회 5일간. 재발성 생식기포진의 억제: 1회 250mg, 1일 2회 부-오심, 두통	발트렉스정500밀리그램(GSK, valaciclovir 0.5g/1,373원, 대상포진-1회 1,000mg 1일 3회, 7일간, 성기포진 감염증-1회 500mg 1일 2회, 재발성인 경우 5일간, 초발성인 경우 증상이 심하면 최대 10일간, 성기포진 감염증의 재발 억제-면역기능 저하 환자 1회 250mg 1일 2회 또는 1일 1회 500mg, 면역기능 저하 환자 1회 500mg 1일 2회, 성기포진의 전염 감소-1일 1회 500mg, 거대세포바이러스 감염 예방-1회 2,000mg 1일 4회, 구순포진-1회 2,000mg 1일 2회, 1일간, 12세 이상 거대세포바이러스 감염 예방-1회 2,000mg 1일 4회, 12세 이상 구순포진 1회 2,000mg 1일 2회, 1일간, 2세 이상-18세 미만 수두-1회 20mg/kg 1일 3회, 5일간, 최대 1회 1,000mg 1일 3회, 부작용-두통, 구역, 복통, 혈청 AST,ALT 증가, 비인두염)	대웅팜시클로비르정250밀리그램(팜시클로비르)_(0.25g/1정/3,844원)	○
	비뇨기과, 신경과	팜비어정750밀리그램(팜시클로비르)_(0.75g/1정)	famciclovir 0.75g	1	정	10,351			대웅팜시클로비르정750밀리그램_(0.75g/1정/11,039원)	○	○
6	비뇨기과	미니모프레신정0.1mg(데스모프레신아세트산염)_(0.1mg/1정)	desmopressin acetate (as desmopressin 89µg)	1	정	735	한국휴텍스제약(주)	일차성 야뇨증(5세 이상): 취침시 0.2mg. 효과 불충분시 최대 0.4mg. 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료(성인): 취침시 0.1mg. 일주일후 효과 불충분시 0.2mg, 계속하여 효과 불충분시 일주일 간격으로 0.4mg까지 증량 부-저나트륨혈증, 두통, 현기증, 말초부종, 빈뇨, 복통, 구역, 구갈, 체중증가	유레민정0.1밀리그램(현대, 데스모프레신아세트산염)_(0.1mg/1정/735원, 원외처방전용))	원외처방전용	○

번호	신청과	품명	성분	규격	단위	상한가	업소명	효능효과, 용법·용량, 부작용	본원대체 품목	경합추천	O.X
7	비뇨 기과	고든정 10mg(타다 라필)	tadalafil 10mg	1	정		(주) 씨티 씨바 이오	발기부전 치료 성인 남성: 권장 1일 1회 10mg, 성 행위 30분 전부터 식사에 상관없이 복용. 20mg까지 증량가능 부-두통, 소화불량, 홍조, CPK치 상승, 등통증, 근육 통, 비출혈, 사지통	고든구강용해필름5,10,20mg(타다라필)(비급 여,원외처방전용)	비급여, 원외 처방전용	○
8	비뇨 기과	나비그라정 50밀리그램 (실데나필시 트르산염)	sildenafil citrate(as sildenafil) 50mg	1	정		(주) 한국 글로 벌제 약	발기부전의 치료 1일 1회 성행위 약 1시간 전 25-50mg. 성행위 4시간 전-30분 전 투여 가능. 65세 이상, 간부전, 중증 신부 전(CrCl 30mL/min 이하), CYP3A4 억제제와 병용시 초회량 25mg. 리토나비르 병용투여자는 48시간동안 최대단일투여용량 25mg 부-홍조, 두통, 소화불량, 어지럼, 심계항진, 안구충혈, 시각이상	부광실데나필정50, 100밀리그램(비급여, 원외 처방전용)	비급여, 원외 처방전용	○
	비뇨 기과	나비그라정 100밀리그 램(실데나필 시트르산염)	Sildenafil Citrate 140.45mg	1	정						○
9	소아 청소년과	애니크라네 오시럽(아목 시실린수화 물-몰은클 라불란산칼 륨)(50mL)	amoxicillin 6g(0.12g/mL)) clavulanate potassium 0.429g(8.58 mg/mL)	50(1)	mL/병	103	안국 약품 (주)	소아: 재발성 또는 지속성 급성중이염, 재발성 급성 부비동염(단, 다 음 위험인자 중 하나 충족-3개월 이내에 급성중이염 또는 급성 부비 동염으로 인한 항생제 투여 경험, 2세 이하, 보육기관에 다니는 소 아) 3개월 이상: 아목시실린 함량(600mg/5mL) 기준 90mg/kg/day, 12 시간 간격으로 분복, 급성중이염은 10일간, 급성부비동염은 7일간 투여 부-점측피부염(예, 기저귀 발진), 설사, 구토, 모넨리아증, 발진	아모크라네오시럽(건일제약주), 아목시실린-클 라불란산칼륨(14:1))(50mL), 103원, 원외처 방전용)	원외처방전 용	○
10	재활 의학과, 신경과	메가트루골 드정	ascorbic acid granule 97% 51.5mg+benfotiamine 35mg+calcium pantothenate 30mg+cholecalciferol granule 4mg+choline bitartrate 30mg+cyanocobalamin 5mg+d- biotin 1% 10mg+dlbasic calcium phosphate hydrate 0.2147g+foli c acid 0.2mg+thioteal 30mg+magnesium oxide 41.5mg+manganese sulfate 15.4mg+nicotinamide 30mg+pyridoxine hydrochloride 30mg+riboflavin 30mg+sodium chondroitin sulfate 20mg+tocopherol acetate 20mg+ursodeoxycholic acid 10mg+yeast molybden 2.5mg+yeast selenium 46.3mg+zinc oxide 18.7mg+D- carotene 20% 25mg	1	정	211	(주) 유한 양행	육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하, 발육기, 노년기의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급, 아연의 보급 만 12세 이상: 1회 1정, 1일 1-2회 부-구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 저 혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 묽은 비점, 부전수축 (심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 고요산혈증, 피부염, 땀·호 흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통 증, 폐부종(부기)	아로나민씨플러스정(일동, ascorbic acid 600mg+biotin 22.5μg +calcium pantothenate 20mg+cyanocobalamin 6μg+ferrous fumarate 13.5mg+folic acid 0.25mg+fursultiamine hydrochloride 27.285mg+nicotinamide 50mg+pyridoxine hydrochloride 5mg+riboflavin butyrate 5mg+tocopherol acetate 20mg+yeast selenium 46.3mg+zinc oxide 9.33mg/326원, 육체피로, 임신수유 기, 병중·병후, 노년기의 비타민 B1, B2, B6, C, E 보급, 아연 보 급, 12세 이상 1일 2정, 1일 1-2회, 부작용-위부불쾌감, 설사, 변 비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복 부팽만감, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열 혼수, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장 애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종)	비급여	○
11	정형 외과, 내과	베아렌투엑 스정(에엽 95%에탄올 연조엑스 (20→ 1))_(90mg/ 1정)	artemisiae argyi folium 95% ethanol ext.(20→1) 90mg	1	정	205	대웅 바이 오 (주)	급, 만성위염의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종) 개 선 1회 90mg 1일 2회 부-트림, 복부팽만, 소화불량, 오심, 구역	알비스정(대웅, 급여정지, ranitidine 75mg sucrose octasulfate 0.102g tripotassium bismuth dicitrate (as bismuth oxide 40.5mg, as potassium 12mg) 0.1g/ 정/254원, 위·십이지장궤양, 위염, 출렁거-헬리코박테리아 역류성식도염, 마취전 투약(멘델슨증후군 예방), 수술후 궤양, NSAID로 인한 위·십이지장궤양, 1회 2정, 1일 2회, 부작용-가역적인 황달성 또는 비황달성 간염, 구역, 구토, 변비, 설사, 복부팽만감, 복통, 현훈, 졸림, 피부소양감, 설 염)	에스트렌에스 정(에엽95% 에탄올연조엑 스(20→ 1))_(90mg/1 정/198원, 삼 진)	○